
RAST SHTATZËN I KONFIRMUAR OSE I DYSHUAR ME COVID-19 : VEÇORITË KLINIKE E NËNËS SË ARDHSHME, MASA PARAPRAKE DHE MENAXHIMI NEONATAL



(1) Dhoma operative e përgatitur për lindjen dhe mundësisht me presion negativ
(2) Stafi i kujdesit shëndetësor i pajisur me mjetet e mbrojtjes personale
(3) Masa paraprake për parandalimin e përhapjes së spërklave dhe kontaktit: veshjen përkatëse, doreza, maskë dhe mbrojtëse për sytë
(4) Reanimimi i neonatit mund të bëhet bazuar në praktikën standarte
(5) Masa paraprake për aerozolizim – veçanërisht me thithjen, intubimin, cPAP-in dhe procedura të tjera që gjenerojnë aerozole



SËMUNDJE AMTARE E NGJASHME ME GRIPIN SEZONAL

Ethe

Grykët e acaruara
Kolla
Pafuqi
Dhimbje muskujsh

MËNYRAT E MUNDSHME TË TANSMETIMIT

Përhapja me spërkla dhe kontakt të afërt

SARS-CoV-2

Procedura që gjenerojnë aerozole: thithja, intubimi, ekstubimi oksigjenimi HFNC, N-cPAP



Përhapja e aerozoleve

Masa paraprake për përhapjen me ajër dhe kontakte të ngushta – MMP përfshirë mbrojtësen e syve dhe maskën N95 ose PAPR, veshjen përkatëse dhe dorezat për personelin e dhomës operative

Miokardit

Pneumoni

Siguria e qumështit të gjirit (?)


Potencial për infeksion postnatal

Enzimat hepatike të rritura

Limfopenia

Diarre

Potencial (?) për transmetim veritkal



Përftimi i qumështit të gjirit nëpërmjet pompës së dedikuar të gjirit dhe higjienës strikte të duarve

MENAXHIMI I NEONATIT

(1) Konsideroni ndarjen e përkohshme të foshnjës nga nëna
(2) Një anëtar i shëndetshëm i stafit mund të ushqejë foshnjën me qumështin e përftuar nga nëna me COVID-19
(3) Nëse foshnja dhe nëna nuk ndahen, duhet të bëhet ushqyerja me gji me maskë dhe duke zbatuar higjienën e duarve
(4) Tamponi nazofaringeal / faringeal dhe rektale (opsional) për RT-PCR brenda 24 orëve dhe përsërit në 48 orë
(5) Izolimi duhet të bëhet gjatë kohës që pritet rezultati i testit

VEÇORI KLINIKE POTENCIALE TEK GRATË SHTATZËNA TË KONFIRMUARA ME COVID-19 (VARIOJNË)

NEONATËT – KRYESISHT ASIMPTOMATIK (*simptomat jo-specifike të tilla si temperatura, gjendja e paqëndrueshme, apnea, distresi respirator, simptomat gastrointestinale, hipotensioni janë të mundshme*)

MËNYRA E LINDJES:

Diktuar nga praktika e zakonshme obstetrike



Heda
ASISTENTJA E SHËNDETIT TUAJ

Ky udhëzues nuk zëvendëson praktikën klinike, por ndihmon dhe lehtëson vendim-marrjen e stafit.
Dizenjoi: Satyan
Burimi: Mimouni dhe bashkëpunëtorë, 2020. Revista Shkencore e Perinatologjisë. Nature

LIRIMI I NEONATIT - sipas statusit klinik; masa paraprake dhe këshillim për kujdesin në banesë në bazë rasti.

ALGORITËM* PËR MENAXHIMIN E GRAVE SHTATZËNA TË DYSHUARA/ KONFIRMUARA PËR INFEKSION COVID-19



Nënë shtatzënë e dyshuar dhe/ose me '*gjendje gripale*'

Tampon nazofaringeal dhe orofaringeal për testim me RT-PCR për prani të SARS-CoV-2 dhe viruse të tjerë respirator (p.sh. gripi, RSV, etj.)




SARS-CoV-2 pozitiv


SARS-CoV-2 negativ

Kujdesi i zakonshëm për nënën dhe neonatin






Mbështetje në njësinë e terapisë intensive për neonatët



Asimptomatik ose prani e infeksionit të lehtë respirator





Maska përdoret për kufizimin e infeksionit në burim



COVID-19 i ashpër me pneumoni dhe/ose SDRA

Mbështetje me kujdes ntensiv

Individët mbi 60 vjeç ose me kushte shëndetësore ekzistuese nuk duhet të përfshihen në kujdesjen e foshnjës – nëse është e mundur!

Simptomatik

SARS-CoV-2 pozitiv

Asimptomatik



Liro foshnjën nga spitali dhe ndiq ecurinë.

SARS-CoV-2 negativ dhe asimptomatik

Kujdesi të bëhet nga një anëtar i shëndetshëm stafit mjekësor (*izolimi apo masat për pengim të përhapjes deri sa nëna të jetë afebrile, përmirësohen simptomat dhe 2 teste negative me 24 orë diferencë nga njëri-tjetri.*)



Ndarja e përkohshme e foshnjës nga nëna (*veçanërisht në rastet me simptomatologji të rënduar – nëse do të ketë*)

Ekipi i shërbimit të kujdesit neonatale ruan qëndrueshmërinë e pacientit dhe masat përkatëse për shmangien e aerozolizimit



(1) Lindja – masat perkatëse praprake për reanimimin
(2) Të konsiderohet ndarja e përkohshme e foshnjës nga nëna

Ekipi i shërbimit neonatal në dispozicion dhe duke ndihmuar në zbatimin e masave për MMP



Specialistët neonatal mbështesin lindjet sipas nevojave klinike



**Ky algoritëm nuk zëvendëson praktikën klinike, por ndihmon dhe lehtëson vendim-marrjen e stafit.*
Dizenjoi: Satyan
Burimi: Mimouni dhe bashkëpunëtorë, 2020. Revista Shkencore e Perinatologjisë. Nature